

ATENOPRESS

ATENOLOL

- Apresentação

25 comprimidos revestidos de 25 mg
25 comprimidos revestidos de 50 mg
25 comprimidos revestidos de 100 mg

- Indicações

ATENOPRESS é indicado no controle da hipertensão arterial, da angina pectoris e de arritmias cardíacas e no tratamento do infarto do miocárdio.

Contra-Indicações de Atenopress

Não deve ser utilizado por pacientes hipersensíveis ao atenolol; nos casos de bradicardia, choque cardiogênico, hipotensão, acidose metabólica, distúrbios severos da circulação arterial periférica, bloqueio cardíaco de segundo ou terceiro grau, síndrome do nodo sinusal, feocromocitoma não tratado e insuficiência cardíaca descompensada e a pacientes pediátricos.

Cuidados e Advertências de Atenopress

Deve-se tomar cuidado especial com pacientes cuja reserva cardíaca esteja diminuída e em pacientes com angina de Prinzmetal. Nos raros casos em que os sintomas possam ser atribuíveis à baixa frequência cardíaca, a dose do **ATENOPRESS** pode ser reduzida.

ATENOPRESS pode modificar a taquicardia da hipoglicemia e pode mascarar os sinais da tireotoxicose. **ATENOPRESS** deve ser administrado com cautela em pacientes com bloqueio cardíaco de primeiro grau, devido ao efeito negativo sobre o tempo de condução.

Ocasionalmente

pode ocorrer aumento na resistência das vias respiratórias em pacientes asmáticos. O tratamento

não deve ser descontinuado abruptamente em pacientes que sofram de doença cardíaca isquêmica.

ATENOPRESS pode agravar os distúrbios da circulação arterial periférica. **ATENOPRESS** pode causar reação mais grave a uma variedade de alérgenos quando administrado a pacientes com história de reação anafilática a tais alérgenos. O uso de **ATENOPRESS** em mulheres que estejam grávidas, amamentando ou que possam engravidar requer que os benefícios antecipados sejam

avaliados contra os possíveis riscos, particularmente no primeiro e no segundo trimestre de gravidez. **ATENOPRESS** é bem tolerado. Em estudos clínicos, os efeitos colaterais foram normalmente atribuíveis às ações farmacológicas do **ATENOPRESS**. Deve-se ter cuidado quando

ATENOPRESS é administrado concomitantemente com: anestésicos, bloqueadores do canal de

cálcio, clonidina, agentes simpatomiméticos e outros.

Posologia de Atenopress

Hipertensão: Dose única oral diária de 50 -100 mg. O efeito pleno será alcançado após uma ou duas semanas. Angina: Dose diária de 100 mg administrada oralmente como dose única ou como 50 mg administrados duas vezes ao dia. É improvável que se obtenha benefício adicional com o aumento da dose. Arritmias: Dose oral adequada de 50-100 mg diários, administrada em dose única. Infarto do miocárdio: Dose oral de 100 mg diários de **ATENOPRESS** para profilaxia a longo prazo do infarto do miocárdio. Insuficiência Renal: Uma vez que **ATENOPRESS** é excretado por via renal, a dose deve ser ajustada nos casos de comprometimento grave da função renal. Para pacientes com depuração de creatinina de 15-35 mL/min/1,73 m² (equivalente a creatinina sérica de 300-600 µmol/L), a dose oral deve ser de 50 mg diários. Para pacientes com depuração de creatinina menor que 15 mL/min/1,73 m² (equivalente a creatinina sérica >600 µmol/L), a dose oral deve ser de 25 mg diários ou 50 mg em dias alternados. Os pacientes que se submetem à hemodiálise devem receber 50 mg, por via oral, após cada diálise.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.

ESTE TEXTO É UM RESUMO, PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS CONSULTE A BULA DO PRODUTO.

ATENOPRESS - Laboratório

HEXAL
Av. Itaboraí, 1425
São Paulo/SP - CEP: 04135-001
Tel: 5585-9090
Fax: 5594-3665