

Calcitran B₁₂[®]

Cálcio + Associações

Recalcificante tônico

FORMA FARMACÉUTICA E APRESENTAÇÃO

Suspensão oral: cartucho com frasco de 150 mL, acompanhado de copo-medida.

VIA ORAL

USO PEDIÁTRICO E ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada 1 mL da suspensão oral, contém:

Fosfato de cálcio tribásico	15 mg/mL
Glicerofosfato de cálcio	16 mg/mL
Cianocobalamina (vit. B ₁₂)	0,001 mg/mL
Ergocalciferol	0,25 mg/mL
Fluoreto de sódio	0,05 mg/mL

Excipientes qsp: Ácido Cítrico, Pectina Cítrica, Sorbitol 70%, Propileno glicol, Álcool Etilico, Metilparabeno, Propilparabeno, Açúcar, Essência de Cereja, Corante Vermelho Eritrosina, Simeticone, Água Deionizada

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Como esse medicamento funciona?

O Calcitran B₁₂[®] possui ação recalcificante.

Por que esse medicamento foi indicado?

O Calcitran B₁₂[®] é um recalcificante tônico, indicado no tratamento e prevenção de carência do cálcio: como raquitismo, disfunção do metabolismo cálcio-fosfórico, desnutrição, como osteoporose, anemia, cárie dentária, gravidez, aleitamento materno além de estimular o crescimento e o desenvolvimento corporal principalmente de crianças.

Qual é o prazo de validade desse medicamento?

O prazo de validade do Calcitran B₁₂[®] é de 24 meses a partir da data de fabricação (vide cartucho).

Quando não devo usar esse medicamento?

O Calcitran B₁₂[®] não deve ser usado por pacientes com hipersensibilidade a qualquer dos componentes da fórmula, hipercalemia (por exemplo, no hiperparatireoidismo, superdosagem de vitamina D, tumores descalcificantes como plasmocitoma, metástases ósseas); insuficiência renal grave, hipercalcúria severa.

O Calcitran B₁₂[®] não deve ser ingerido com bebida alcoólica.

Como devo usar esse medicamento?

Lactentes: 2 mL, duas vezes ao dia, no leite da mamadeira ou em um pouco de água.

Crianças: 5 mL (meio copo-medida), duas vezes ao dia, antes das refeições.

Crianças maiores de 10 anos e adultos: 10 mL (1 copo-medida), duas ou três vezes ao dia, antes das refeições.

"NÃO USE O MEDICAMENTO COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. ANTES DE USAR OBSERVE O ASPECTO DO MEDICAMENTO".

"É IMPORTANTE SALIENTAR QUE A POSOLOGIA INDICADA NA BULA DEVE SER RIGOROSAMENTE RESPEITADA, PARA QUE SE OBTENHA O RESULTADO ESPERADO DO MEDICAMENTO".

"NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DE SEU CIRURGIÃO-DENTISTA".

"TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS".

"INFORME AO SEU MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA SE OCORRER GRAVIDEZ OU INICIAR AMAMENTAÇÃO DURANTE O USO DESTE MEDICAMENTO".

"INFORME AO MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA O APARECIMENTO DE REAÇÕES INDESEJÁVEIS".

"INFORME AO SEU MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA SE VOCÊ ESTÁ FAZENDO USO DE ALGUM OUTRO MEDICAMENTO".

"AGITE ENERGICAMENTE ANTES DE USAR".

"ESTE MEDICAMENTO CONTÉM AÇÚCAR, PORTANTO, DEVE SER USADO COM CAUTELA EM PORTADORES DE DIABETES".

Quais os males que esse medicamento pode causar?

É desconhecida a intensidade e frequência de reações adversas.

O que fazer se alguém usar uma grande quantidade deste medicamento de uma só vez?

Não são conhecidos episódios de ingestão excessiva, mas podem apresentar sintomas de hipercalemia, distúrbios gastrointestinais leves. Avise seu médico ou cirurgião dentista em casos de ingestão de altas doses.

Onde e como devo guardar este medicamento?

Conservar em temperatura ambiente antes e após abertura da embalagem do produto (entre 15 - 30°C), ao abrigo da luz.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

A integridade funcional de todos os tecidos orgânicos está na dependência do cátion cálcio, principalmente na constituição estrutural do sistema ósseo. A deficiência é facilmente instalada na vigência de alimentação pobre em cálcio, nos períodos de crescimento, gravidez e lactação. A vitamina D exercendo ação fixadora e equilibradora do cálcio estabelece a terapêutica cálcica racional e a vitamina B₁₂, poderoso agente metabólico e antianêmico, age nos casos de subnutrição e falta de desenvolvimento corporal. O fosfato tricálcico e o glicerofosfato de cálcio, fornecendo ao organismo fósforo e cálcio, estabelecem o sinergismo cálcio-fósforo-vitamina D, necessário à uma terapêutica racional. O fluoreto de sódio, pelo flúor, completa a fórmula como profilático da cárie dentária.

INDICAÇÕES

Medicação recalificante tônica, empregada nas convalescenças, estados de desnutrição, nos períodos de crescimento, gravidez e lactação e na profilaxia da cárie dentária.

CONTRA-INDICAÇÕES

Hipersensibilidade ao medicamento, hipercalemia (por exemplo, no hiperparatireoidismo, superdosagem de vitamina D, tumores descalcificantes como plasmocitoma, metástases ósseas); insuficiência renal grave, hipercalcúria severa.

PRECAUÇÕES

Para pacientes predispostos à formação de cálculos no trato urinário, recomenda-se um aumento na ingestão de líquidos e nestes casos a dosagem a ser utilizada deverá ser estabelecida pelo médico.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

A absorção de cálcio pode reduzir, se houver uso concomitante com álcool, verapamil e possivelmente a outros bloqueadores de canais de cálcio. O cálcio administrado em altas doses a pacientes digitalizados pode aumentar o risco de arritmias cardíacas.

REAÇÕES ADVERSAS

São desconhecidas as reações adversas.

POSOLOGIA

Lactentes: 2 mL, duas vezes ao dia, no leite da mamadeira ou em um pouco de água.

Crianças: 5 mL (meio copo-medida), duas vezes ao dia, antes das refeições.

Crianças maiores de 10 anos e adultos: 10 mL (1 copo-medida), duas ou três vezes ao dia, antes das refeições.

CUIDADOS DA ADMINISTRAÇÃO

A posologia recomendada deve ser respeitada devidamente e antes das principais refeições ou aleitamento materno.

SUPERDOSAGEM

Não são conhecidos episódios de ingestão excessiva, mas podem apresentar sintomas de hipercalemia, distúrbios gastrointestinais leves. Avise seu médico ou cirurgião dentista em casos de ingestão de altas doses.

Nº do lote, Data de Fabricação e Prazo de Validade: Vide Cartucho.

Registro MS nº 1.5620.0002.001-7

Farmacêutico Responsável.: Dr. Carlos Augusto Loureiro Paiva - CRF-PE: 2187

Fabricado por:

VIDFARMA INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

Rodovia BR 232, Km 63, s/nº - Parque Industrial - Pombos - PE

CNPJ 03.993.167/0001-99

Indústria Brasileira

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 28 11 606

e-mail: sacvidfarma@terra.com.br

site: www.vidfarma.com.br