

Cetoconazol

Composição de Cetoconazol

cada comprimido contém: **cetoconazol** 200 mg; excipientes: celulose microcristalina, amido, estearato de magnésio, **lactose**, ácido etilenotetracético.

Posologia e Administração de Cetoconazol

crianças: (acima de 2 anos) até 20 kg: 1/4 a 1/2 comprimido (50 a 100 mg) uma vez ao dia; 20 a 40 kg: 1/2 a 1 comprimido (100 a 200 mg) uma vez ao dia; acima de 40 kg: 1 a 1:1/2 comprimido (200 a 300 mg) uma vez ao dia; adultos: 1 a 2 comprimidos (200 a 400 mg) administrados em uma única dose diária, variável e específica para cada tratamento. A duração do tratamento com **Cetoconazol**, que varia entre 1 a 8 semanas, assim como as doses, deve ser seguida conforme orientação médica. Os comprimidos devem ser ingeridos durante uma das refeições. Superdosagem: se ocorrer ingestão acidental excessiva, proceder **lavagem gástrica** com bicarbonato de sódio.

Precauções de Cetoconazol

Cetoconazol não tem penetração satisfatória no **Sistema Nervoso Central**, não sendo, portanto, apropriado para o tratamento de **meningite** causada por fungos. **Cetoconazol** deve ser administrado sempre durante uma das refeições diárias. Durante tratamento com **Cetoconazol**, os pacientes devem ser submetidos à prova de função **hepática** periodicamente, em especial aqueles com antecedentes de disfunções **hepáticas**; se ocorrerem alterações laboratoriais acompanhadas de manifestações clínicas, o uso de **Cetoconazol** deve ser interrompido. O uso em pacientes idosos (acima de 65 anos) requer prescrição médica. Interações medicamentosas: **Cetoconazol** é melhor absorvido pelo **estômago** em meio ácido, devendo, portanto, ser evitadas associações com drogas que diminuam a secreção gástrica, tais como: **antiácidos**, anticolinérgicos e bloqueadores dos receptores H2. Em associação com Rifampicina, **Cetoconazol** tem os seus níveis sanguíneos reduzidos, sendo, portanto, desaconselhável. Caso **Cetoconazol** seja administrado concomitantemente com ciclosporina A, os níveis sanguíneos da última devem ser rigorosamente acompanhados, pois **Cetoconazol** provoca um aumento dos mesmos. Em tratamento simultâneo de **Cetoconazol** com **anticoagulantes** do tipo cumarina, o efeito **anticoagulante** pode ser aumentado, devendo assim ser monitorado. O uso simultâneo de **Cetoconazol** com difenilhidantoína pode alterar o **metabolismo** de uma ou ambas as drogas, sendo recomendado um acompanhamento.

Reações Adversas de Cetoconazol

nas doses recomendadas, **Cetoconazol** é geralmente bem tolerado; a maioria das reações adversas são passageiras e reversíveis. As reações mais comuns são: **náuseas, vômitos, prurido** e dor abdominal. Outras reações que aparecem em menor frequência são: **tontura, febre, calafrio, fotofobia, sonolência, dor de cabeça** e **diarréia**. Algumas reações adversas são extremamente raras, mas já foram relatadas, dentre elas: **trombocitopenia, ginecomastia, impotência** e oligospermia (devido baixa nos níveis de testosterona). Durante o tratamento prolongado com **Cetoconazol**, podem ocorrer disfunções hepatocelulares de origem idiossincrásica manifestadas por alterações nas provas de função **hepática** (aumento de transaminases, **bilirrubinas**, fosfatase alcalina).

Contra-Indicações de Cetoconazol

Por não existirem estudos específicos, **Cetoconazol** é contra-indicado em crianças menores de 2 anos de idade. Já foram descritos casos de **hepatotoxicidade** com o uso de **Cetoconazol**, portanto é contra-indicado a pacientes portadores de hepatopatias ativas
1. **Cetoconazol** não deve ser administrado em pacientes que tenham apresentado prévia hipersensibilidade à droga.

Indicações de Cetoconazol

tratamento profilático das **infecções** micóticas em pacientes imunodeprimidos por medicação, após queimaduras e/ou transplantes; tratamento das **infecções** da boca e do trato gastrointestinal; tratamento das **infecções** micóticas da pele, **unhas** e couro cabeludo por dermatófitos ou leveduras; tratamento da **candidíase** vaginal (forma clínica e crônica); tratamento para evitar recidivas das micoses sistêmicas ou até obter remissão sorológica; tratamento das **infecções** micóticas sistêmicas.

Apresentação de Cetoconazol

caixa com 1 blister de 10 comprimidos.

CETOCONAZOL - Laboratório

DUCTO
Rua VPR 3, Quadra 2-A, Mgd. 20/21
Anápolis/GO - CEP: 75133-600
Tel: (62)310-2500
Fax: (62)800-2122

[Ver outros medicamentos do laboratório "DUCTO"](#)