

Cetoprofeno

Composição do Cetoprofeno

cada cápsula contém: **cetoprofeno** 50 mg; excipientes: **lactose**, amido de milho, glicolato amido de sódio, dióxido de silício, talco e estearato de magnésio.

Posologia e Administração do Cetoprofeno

adultos: via: oral 1 cápsula 2 vezes ao dia ou 1 cápsula 3 vezes ao dia às refeições. A critério médico, as posologias poderão ser aumentadas até 300 mg (dose máxima diária). Superdosagem: em caso de superdosagem deve-se proceder à **lavagem gástrica** ou administração de um emético e tratar sintomaticamente. Hidratação, monitorização da excreção urinária e correção da **acidose** pode ser necessária.

Precauções do Cetoprofeno

O **Cetoprofeno** deve ser utilizado com cautela em pacientes com antecedentes de **úlcer**a gastroduodenal. Caso ocorra sangramento gastrointestinal, o tratamento deve ser interrompido. Deve ser utilizado com precaução em pacientes com **insuficiência renal** grave, visto que a eliminação do medicamento se efetiva principalmente pela **urina**. Existe a possibilidade de ocorrer **vertigem** ou **tontura** com o uso do **Cetoprofeno**, portanto, pacientes que operam máquinas ou dirigem veículos devem ser alertados sobre esta possibilidade. Idosos (acima de 65 anos) só devem fazer uso do medicamento sob orientação médica. - Interações medicamentosas: **anticoagulantes** orais e heparina: o uso concomitante é desaconselhável, pois o **Cetoprofeno** pode aumentar os efeitos dos **anticoagulantes** pelo aumento do risco **hemorrágico** por inibição da função plaquetária e irritação da **mucosa** digestiva. Quando a associação com inibidores da **vitamina K** for necessária, deve-se acompanhar os valores do tempo de **protrombina**, em razão de eventual risco de potenciação. Sulfamidas: têm os seus efeitos **hipoglicemiantes** aumentados. Metotrexato: o **Cetoprofeno** aumenta o risco de toxicidade **hemorrágica**. Sais de lítio: o uso concomitante é um fator de elevação da litemia, eventualmente até níveis tóxicos. O **Cetoprofeno** pode diminuir a atividade dos **diuréticos**. O **Cetoprofeno** pode aumentar um efeito aditivo com a ticlopidina (aumento da atividade antiagregante plaquetária). O uso concomitante com outros agentes antiinflamatórios não esteróides pode aumentar o risco ulcerogênico e **hemorrágico**.

Reações Adversas do Cetoprofeno

gastrointestinais: desconforto gastrointestinal, dor gástrica, **náusea**, **vômito**, **constipação**, **diarréia**, **úlcer**a gastroduodenal, **hemorragia** digestiva e perfurações intestinais. Hipersensibilidade: erupções, **rash cutâneo**, **prurido**, possibilidade de aparecimento de crise asmática, diminuição moderada na contagem de glóbulos vermelhos e raramente **leucopenia**. Outras reações: excepcionalmente pode ocorrer zumbido nos ouvidos, perda da audição, **visão** borrada e alteração no paladar. Alguns casos de valores anormais das transaminases, **uréia**, desidrogenase láctica e fosfatase alcalina foram relatados.

Contra-Indicações do Cetoprofeno

pacientes com história de hipersensibilidade ao **Cetoprofeno** e em pacientes que desenvolvem crises de **rinite**, **asma** ou **urticária** pela administração da aspirina ou outros antiinflamatórios inibidores da prostaglandina. **Insuficiência hepática** ou **renal** severa. **Úlcer**a gastroduodenal ativa. Durante o primeiro trimestre e último trimestre de **gravidez**. Durante o período de **amamentação**.

Indicações do Cetoprofeno

tratamento de processos reumáticos: **artrite reumatóide**, espondilite anquilosante, epicondilites, tenossinovites, tendinites, sinusites, capsulites, bursites, periartrose escapuloumeral, osteoartrites esclerodermia, periartrose nodosa, **lúpus eritematoso sistêmico**, pseudopodiartrite rizomélica, **síndrome** de Reiter, **reumatismo** psoriático condrocalcínose, **gota**. Lesões traumáticas como contusões e esmagamento, fraturas, **entorses**, luxações. Profilaxia e tratamento de **cefaléia vascular**.

Apresentação do Cetoprofeno

caixa com 24 cápsulas de 50 mg.

CETOPROFENO - Laboratório

NEO QUIMICA
Rua VPR 1, Quadra 2-A, Mgd. 4
Anápolis/GO - CEP: 75133600
Tel: (62)316-1055
Fax: (62)316-1022

[Ver outros medicamentos do laboratório "NEO QUIMICA"](#)