

doril

ácido acetilsalicílico- cafeína

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES

Comprimido. Display contendo 25 blisteres com 6 comprimidos em cada blister.
Cartucho contendo 20 comprimidos

USO ADULTO

USO ORAL

COMPOSIÇÃO

cada comprimido contém:

ácido acetilsalicílico	500,0 mg
cafeína	30,0 mg
excipiente* q.s.p.	1 comprimido
* amido e corante CI nº 45.430.	

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Ação esperada do medicamento: DORIL atua no alívio da dor e redução da febre. A cafeína confere um alívio também nas dores de cabeça. Os sinais de melhora nos sintomas podem ocorrer em um prazo variável de dias, após o início do tratamento. Seu médico é a pessoa adequada para dar-lhe mais informações sobre o tratamento; siga sempre suas orientações. Não devem ser utilizadas doses superiores às recomendadas. A interrupção repentina deste medicamento não causa efeitos desagradáveis, nem risco, apenas cessará o efeito terapêutico.

Cuidados de armazenamento: conservar em temperatura ambiente (ambiente com temperatura entre 15°C e 30°C) proteger da luz e umidade.

Prazo de validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

Ao comprar qualquer medicamento, verifique o prazo de validade.

Atenção: Não use medicamento com prazo de validade vencido. Além de não obter o efeito desejado, você poderá prejudicar sua saúde.

Gravidez e Lactação: informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe ao médico se está amamentando.

Cuidados de Administração: siga sempre a orientação do seu médico, respeitando os horários, as doses e duração do tratamento.

Interrupção do tratamento: não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Reações adversas: em alguns casos, o produto pode produzir, transitórias na maioria das vezes, algumas reações desagradáveis. Informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.

"TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS"

Durante o tratamento, recomenda-se evitar a ingestão de bebidas alcoólicas.

CONTRAINDICAÇÕES: O PRODUTO É CONTRAINDICADO PARA PACIENTES QUE APRESENTAREM ANTECEDENTES DE HIPERSENSIBILIDADE A QUALQUER UM DOS COMPONENTES DA FÓRMULA.

PRECAUÇÕES: A ADMINISTRAÇÃO DO PRODUTO DEVE SER CUIDADOSA EM PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS, SOB RIGOROSA SUPERVISÃO MÉDICA.

"CRIANÇAS OU ADOLESCENTES NÃO DEVEM USAR ESTE MEDICAMENTO PARA CATAPORA OU SINTOMAS GRIPAIS ANTES QUE UM MÉDICO SEJA CONSULTADO SOBRE A SÍNDROME DE REYE, UMA RARA, MAS GRAVE DOENÇA ASSOCIADA A ESSE MEDICAMENTO."

"INFORME AO SEU MÉDICO SOBRE QUALQUER MEDICAMENTO QUE ESTEJA USANDO, ANTES DO INÍCIO, OU DURANTE O TRATAMENTO."

"NÃO TOME MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE"

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS E FARMACOLÓGICAS: o mecanismo de ação do produto se deve aos seus constituintes ativos, isto é, o ácido acetilsalicílico e a cafeína. Como analgésico, o ácido acetilsalicílico eleva o limiar

doloroso, admitindo-se ainda uma atividade periférica bloqueadora da bradicinina, polipeptídeo considerado o mediador químico da dor. Nas doses normalmente indicadas para o uso do produto, não é comum ser observada a ação corticosteroimimética dos salicilatos, isto é, a excitação da neuro-hipófise. A cafeína, na dose em que é encontrada no produto, exerce ação produtora do estímulo dos centros psíquicos, equilibrando as propriedades terapêuticas do fármaco.

INDICAÇÕES

Analgésico e antitérmico.

CONTRAINDICAÇÕES

O ÁCIDO ACETILSALICÍLICO NÃO DEVE SER EMPREGADO EM PACIENTES PREDISPOSTOS A DISPEPSIAS, OU SABIDAMENTE PORTADORES DE ALGUMA LESÃO DA MUCOSA GÁSTRICA. NÃO DEVE SER ADMINISTRADO A PACIENTES COM INTOLERÂNCIA GÁSTRICA AO ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, A PORTADORES DE LESÃO HEPÁTICA GRAVE E A PACIENTES HEMOFÍLICOS. DEVE-SE TOMAR CUIDADO EM PACIENTES COM FUNÇÃO RENAL COMPROMETIDA E, PARTICULARMENTE EM CRIANÇAS, QUANDO O PACIENTE ESTÁ DESIDRATADO. COMO TODO MEDICAMENTO, O ÁCIDO ACETILSALICÍLICO É ABSOLUTAMENTE CONTRAINDICADO NOS TRÊS PRIMEIROS MESES DE GRAVIDEZ E, APÓS ESSE PERÍODO, SO DEVE SER EMPREGADO NOS CASOS DE ABSOLUTA NECESSIDADE E SOB ORIENTAÇÃO MÉDICA. NO CASO PARTICULAR DO ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, QUE DEVIDO A VÁRIOS MECANISMOS PROLONGA O TEMPO DE SANGRAMENTO, A SUA ATIVIDADE E UTILIZAÇÃO É CONTRAINDICADA EM GRÁVIDAS NO FIM DA GESTAÇÃO, BEM COMO A HEMOFÍLICOS. PELO MESMO MOTIVO, A TERAPIA COM O ÁCIDO ACETILSALICÍLICO DEVERÁ SER SUSPENSA, NO MÍNIMO, 2 SEMANAS ANTES DE CIRURGIAS.

PRECAUÇÕES/ADVERTÊNCIAS

Alguns efeitos do ácido acetilsalicílico podem ser potencializados pelo álcool. Pode ser aumentada a atividade dos anticoagulantes cumarínicos e das sulfoniluréias hipoglicemiantes. Os anticoagulantes podem acentuar o efeito hemorrágico do ácido acetilsalicílico sobre a mucosa gástrica. A atividade do metotrexato pode ser acentuadamente aumentada, bem como sua toxicidade. Diminui o efeito dos uricosínicos como probenecida e sulfipirazona, barbituratos e outros sedativos podem mascarar os sintomas respiratórios da superdosagem com o ácido acetilsalicílico. Não se recomenda o uso em crianças abaixo de 1 ano. Crianças ou adolescentes não devem usar este medicamento para catapora ou sintomas gripais antes que um médico seja consultado sobre a "Síndrome de Reye", uma rara, mas grave doença associada a esse medicamento.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Ainda não foram totalmente relacionadas as interações do produto com outras drogas e/ou medicamentos.

REAÇÕES ADVERSAS E EFEITOS COLATERAIS

É POSSÍVEL A OCORRÊNCIA DE IRRITAÇÃO E LESÃO DA MUCOSA GASTROINTESTINAL, COM PERDA DE SANGUE ASSINTOMÁTICA E EM PEQUENAS QUANTIDADES SEM SIGNIFICAÇÃO CLÍNICA. NO ENTANTO, NA TERAPIA A LONGO PRAZO, PODE DESENVOLVER-SE ANEMIA FERROPRIVA. IRRITAÇÃO DA MUCOSA PODE OCORRER MESMO EM DOSES BAIXAS E CAUSAR DISPEPSIAS, EROSÃO, HEMATÊMESE E MELENA. PODE OCORRER HIPERSENSIBILIDADE MANIFESTADA PRINCIPALMENTE COMO ASMA (FREQUENTEMENTE ASSOCIADA A POLÍPOS NASAIS E RINITE, URTICÁRISE E OUTRAS MANIFESTAÇÕES CUTÂNEAS, EDEMA ANGIONEURÓTICO, BRONCOSPASMO PAROXÍSTICO COM DISPNEIA), PODEM OCORRER DISCRASIAS SANGÜÍNEAS QUE INCLUEM ANEMIA APLÁSICA, AGRANULOCITOSE, GRANULOCITOPENIA E TROMBOCITOPENIA. O USO PROLONGADO DO ÁCIDO ACETILSALICÍLICO EM ALTAS DOSES TEM SIDO ASSOCIADO COM NECROSE PAPILAR RENAL. EVIDÊNCIAS NÃO CONCLUSIVAS RELACIONAM O USO DO ÁCIDO ACETILSALICÍLICO COM A SÍNDROME DE REYE.

POSOLOGIA E MODO DE USAR

Adultos: tomar 1 a 2 comprimidos, de 4 em 4 horas, até 6 comprimidos ao dia.

SUPERDOSAGEM

NA EVENTUAL SUPERDOSAGEM ACIDENTAL, IMEDIATAMENTE SUSPENDER A MEDICAÇÃO E PROCURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA. RECOMENDA-SE TRATAMENTO DE SUPORTE SINTOMÁTICO.

PACIENTES IDOSOS

Não foram relatadas restrições quanto ao uso do produto em pacientes com mais de 65 anos de idade.

"SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR; NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA".

Venda sem prescrição médica.

Número do lote, data de fabricação e prazo de validade: vide cartucho/display ou blister



Reg. MS 1.7817.0007 - Farm. Resp.: Dr. Carlos Takashi Maki - CRF - SP nº 5606
Fabricado por: Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S/A - Rua VPR 01, Quadra 02A, Módulo 4, DAIA - Anápolis - GO.
Registrado por: Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S/A - Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, 1000 - Banerji - S.P. - CNPJ nº 61.082.426/0002-07 - Indústria Brasileira - Marca Registrada.

42.055-VPR3