

# Dorilen

Legrand



Princípio ativo: **dipirona** Não necessita de receita

Publicidade

**Indicações:** Manifestações dolorosas em geral; como antitérmico; nas dores espásticas em geral como cólicas do trato gastrointestinal, cólicas renais e hepáticas; cefaléia; nevralgias, mialgias, artralgias, dores pós-operatórias.

**Contra-Indicações:** Hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

Lesões renais ou hepáticas graves.

Discrasias sanguíneas.

Púrpura trombocitopênica.

Crianças com menos de 2 anos de idade.

Gravidez e lactação.

**Interação:** Pode haver potencialização de efeitos com álcool.

Pode ocasionar redução dos níveis da ciclosporina.

Pode sofrer ou provocar aumento das reações adversas com clorpromazina.

**Posologia:** Comprimidos:

- Dose média: 1 a 2 comprimidos, a intervalos mínimos de 6 horas.

Gotas:

- Dose média para adultos: 30 a 60 gotas, a intervalos mínimos de 6 horas.

Dose média para crianças:

- Acima de 2 anos: 8 a 16 gotas, a intervalos mínimos de 6 horas.

Injetável:

- Dose média: 1/2 a 1 ampola por via intramuscular, a intervalos mínimos de 6 horas.

**Classe Terapêutica:** Analgésico, Antiespasmódico e Antipirético

**Categorias:** Dor e Contusão, Analgésico e Antitérmico