

Enxak

Composição de Enxak

TARTARATO DE ERGOTAMINA 2 MG.

Posologia e Administração de Enxak

POR VIA SUBLINGUAL, O PRIMEIRO COMPRIMIDO DEVE SER ADMINISTRADO TAO LOGO SE MANIFESTEM OS SINAIS DA ENXAQUECA. OUTRO COMPRIMIDO PODE SER USADO EM UM INTERVALO DE 1 HORA, SE NECESSARIO, MAS A DOSAGEM NAO DEVE EXCEDER 3 COMPRIMIDOS (6 MG) EM 24 HORAS. A DOSAGEM LIMITE E DE 10 MG EM 1 SEMANA.

Precauções de Enxak

O USO PROLONGADO OU A DOSAGEM EXCESSIVA NAO E RECOMENDADA DEVIDO AO PERIGO DO ERGOTISMO.

Contra-Indicações de Enxak

INFECCOES, DOENCAS MUSCULARES, DOENCA HEPATICA, DOENCA RENAL E GRAVIDEZ.

Indicações de Enxak

ENXAQUECA COM AURA E SEM AURA, CEFALEIA VASCULAR, CEFALEIA HISTAMINICA E CLUSTER.

Apresentação de Enxak

CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS DE 2 MG.

ENXAK - Laboratório

CAZI

Rua Antônio Lopes, 17 Jandira

São Paulo/SP - CEP: 06600-000

Tel: 011 427-5155

Fax: 011 427-5144