

# Laboratório

União Química

## Referência

Diclofenaco 50mg

## Apresentação de Fenaren

sol. inj. 75 mg cx. c/ 10 amp. de 3 ml sol. gotas fr. c/ 10 ml compr. 50 mg cx. c/ 20 un. compr. AP 100 mg cx. c/ 10 un.

## Contra-indicações de Fenaren

Úlcera péptica. Hipersensibilidade à substância ativa. Pacientes que apresentam crises de asma, rinite aguda ou urticária precipitadas pelo ácido acetilsalicílico ou por outras drogas inibidoras da prostaglandina-sintetase. Não utilizar **Fenaren** injetável em crianças. Não é indicada para crianças abaixo de 14 anos. Com exceção de casos de artrite juvenil crônica.

## Fenaren - Posologia

Adultos: Comprimidos revestidos e de ação prolongada (AP): em geral a dose inicial diária é de 50 mg, 3 vezes por dia. Nos casos mais leves e na fase de manutenção, 100mg por dia são suficientes (2 comprimidos de 50 mg ou 1 comprimido de 100mg). Os comprimidos devem ser ingeridos sem mastigar, antes das refeições. No tratamento da dismenorréia primária recomenda-se a dose diária de 50 a 150 mg, adaptada individualmente. A dose inicial de 50 a 100 mg deve ser administrada e, se necessário, elevada no curso de vários ciclos menstruais até o máximo de 200 mg. O tratamento deve ser iniciado com o aparecimento dos primeiros sintomas e prolongado por alguns dias, dependendo da intensidade da sintomatologia. Injetável: a posologia diária é de 1 ampola, por via intramuscular profunda, no quadrante superior externo da região glútea. Excepcionalmente, nos casos graves, podem ser aplicadas 2 ampolas por dia, com intervalo de algumas horas, em lados alternados. A forma injetável deve ser usada por períodos curtos (não devendo ser dada por mais de 2 dias) , reservando-se a forma comprimidos e gotas para a manutenção. Essa forma não é adequada para uso em crianças. Cuidados na aplicação de injeções intramusculares: 1) fazer a higiene rigorosa com álcool no local onde será aplicada a injeção; 2) aplicar no quadrante superior externo da região glútea conforme a figura; 3) a agulha deve ser posicionada perpendicularmente à pele e introduzida profundamente no músculo; 4) é obrigatória a aspiração do êmbolo após a introdução da agulha para certificar-se de que não houve perfuração de vaso sanguíneo. Se for aspirado sangue, interromper imediatamente a aplicação; 5) aplicar a injeção lentamente.

Suspensão Oral - Gotas: Cada gota contém 0,5 mg de Diclofenaco. Agite antes de usar e ajuste o número de gotas ao esquema posológico.