

# salicilato de metila + associações

Pomada

Aerosol

## **IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO FORMAS FARMACÊUTICAS E APRESENTAÇÕES:**

Pomada: caixa com uma bisnaga contendo 20 g.

Aerosol: tubo com 60 ml e 150 ml.

## **USO ADULTO E PEDIÁTRICO**

(crianças maiores de 2 anos).

**COMPOSIÇÃO: mostarda, essência de alecrim, parafina branca, petrolato sólido. mostarda, álcool etílico, propelente.**

Pomada

Cada grama contém:

salicilato de metila ..... 0,0440 ml

cânfora ..... 0,0440 g

mentol ..... 0,0200 g

essência de terebintina ..... 0,2222 ml

Veículo: essência de alfazema, essência de

Aerosol

Cada ml contém:

salicilato de metila ..... 0,0333 ml

cânfora ..... 0,0333 g

mentol ..... 0,0083 g

essência de terebintina ..... 0,0833 ml

Veículo: essência de alfazema, essência de

## **INFORMAÇÕES AO PACIENTE**

### **AÇÃO ESPERADA DO MEDICAMENTO:**

O produto aumenta a circulação periférica, devido à presença de substâncias rubefacientes que estão presentes na sua formulação favorecendo o aumento da temperatura da epiderme, aliviando temporariamente as dores provocadas pelas mialgias e artralgias.

### **CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:**

Pomada

## **Aerosol**

*Mantenha em temperatura ambiente (15 a 30°C).*

*Deve ser conservado em local fresco, longe de chama, não devendo ser furada ou incinerada.*

*PRAZO DE VALIDADE: 36 meses a partir da data de fabricação (vide cartucho da Pomada ou tubo do Aerosol). Não use medicamentos com o prazo de validade vencido. GRAVIDEZ E LACTAÇÃO:*

*Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe ao médico se está amamentando.*

### **CUIDADOS DE ADMINISTRAÇÃO:**

*Não devem ser utilizadas doses superiores às recomendadas. Utilizando o produto.*

*A embalagem deve ser incinerada. Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico. REAÇÕES ADVERSAS:*

*O produto não deve ser usado por pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Este medicamento está contraindicado em crianças menores de 2 anos. Não deverá ser aplicado sobre feridas abertas. Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento. Suspender o uso em caso de hipersensibilidade na pele. NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE.*

### **INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

#### **CARACTERÍSTICAS:- salicilato de metila:**

*Revulsivo orgânico volátil, age produzindo ação local irritante, com efeitos indiretos de atividade à distância sobre estruturas somáticas (músculos), serosas, articulações, vísceras e de estimulação reflexa dos centros bulbares. Provoca analgia e hiperemia nas regiões cutâneas em que é aplicado, inervadas pelo mesmo segmento do sistema nervoso central.*

*-cânfora:*

*Possui ação irritante cutânea, revulsiva, útil nos processos dolorosos de estruturas profundas, tipo fibrosite, mialgia, lumbago. Produz ainda leve anestesia local.*

*- mentol:*

*Aplicado localmente, causa sensação de frio por estímulo específico dos receptores e, em seguida, anestesia discreta.*

*- essência de terebintina:*

*Age como rubefaciente produzindo dilatação local e aliviando a dor das estruturas profundas.*

**INDICAÇÕES:**

*Reumatismo, nevralgias, torcicolos, contusões e dores musculares.*

**CONTRA-INDICAÇÕES:**

*Antecedentes de sensibilização aos componentes do produto.*

*O produto está contra-indicado para crianças menores de 2 anos de idade.*

**PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS**

*Não deverá ser aplicado sobre feridas abertas. Em caso de irritação suspenda o uso.*

*Ainda não foram totalmente relacionadas as interações do produto com outras drogas e/ou medicamentos.*

**REAÇÕES ADVERSAS/COLATERAIS:**

**POSOLOGIA:**

*Friccione a parte dolorida durante alguns minutos com pequena quantidade do produto, envolvendo-a depois com pano de flanela ou lã, 2 a 3 vezes ao dia.*

**SUPERDOSAGEM:**

*Na eventual superdosagem acidental, suspender imediatamente a medicação e procurar assistência médica. Recomenda-se tratamento de suporte sintomático.*

**PACIENTES IDOSOS:**

*Não foram relatadas restrições quanto ao uso do produto em pacientes maiores de 65 anos.*

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR.**

**NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.**

*Número do lote, data de fabricação e prazo de validade: vide cartucho/tubo.*

*Registro MS - 1.3346.0007*

*Farm. Resp.: Vera Lúcia Carvalho Mazzola*

*CRF-SP n° 8589*

*Propriedade:*

*BIO MACRO Laboratório Farmacêutico Ltda*

*CNPJ 57.934.713/0001-40 - Indústria*

*Pomada:*

*UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A*

*Trecho 01 - Conj. 11 Lote 06 A 12 - Pólo de Desenvolvimento JK*

*Santa Maria - DF - CEP 72549-555 SAC*

*0800 11 1559*

*CNPJ 60.665.981/0007-03 - Indústria*

*Farm. Resp.: Luciana de Paula Macedo -  
CRF-DF n° 1352*

*Aerosol:*

*UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A*

*Rua José Pedro de Souza, 105 – Pouso*

*Alegre – MG*

*CEP 37550-000 SAC 0800 11 1559*

*CNPJ 60.665.981/0005-41 – Indústria*

*Farm. Resp.: Tiago César da Silva Andrade*

*- CRF-MG n° 17931*

*Envasado por: Envasamento Tecnologia de Aerossóis Ltda.*

*Av. Alberto Jackson Byngton, 2870 –*

*Osasco – SP*

*CNPJ 62.970.991/0001-92*

*EE 895007 B*

*Ainda não são conhecidas a intensidade e*

*GELO-BIO Aerosol, evitar inalar GELO-BIO Aerosol*

*GELO-BIO  
Ainda não são conhecidas a intensidade e a frequência das reações  
adversas.*

***UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A***

***Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 90 - Embu-Guaçu - SP***

***CEP 06900-000 - SAC 0800 11 1559***

***CNPJ 60.665.981/0001-18 - Indústria Brasileira***