INFALID

Indicações: É indicado em todas as doenças que requerem atividade antiinflamatória, analgésica ou antipirética. No tratamento de estados flogísticos dolorosos e não-dolorosos acompanhados ou não por febre, inclusive os relacionados ao aparelho ostearticular.
Contra-Indicações: Nimesulida é contra-indicada em pacientes com hipersensibilidade individual à nimesulida, ao ácido acetilsalicílico ou a outros fármacos antiinflamatórios não-esteróides.
Interação: - Pode aumentar os riscos de efeitos adversos renais com: Paracetamol, Ciclosporina e medicamentos nefrotóxicos.
- Pode aumentar os riscos de efeitos adversos gastrintestinais com: Álcool, Corticosteróides, Suplemento de Potássio, Aspirina e Antiflamatório não esteróidais ex: Cataflan.
- Pode aumentar os riscos de sangramento com: Anticoagulantes Orais, Heparina, Ácido valpróico, colchicina e outros inibidores da agregação plaquetária.
- Pode aumentar a ação de: Antidiabéticos orais, insulina e lítio.
- pode diminuir a ação de: Anti-hipertensivos e Diuréticos.
Posologia: Adultos: 50 - 100 mg (1/2 a 1 comprimido) duas vezes ao dia, podendo alcançar até 200 mg duas vezes ao dia.
Crianças: Gotas - Crianças acima de 1 ano: administrar uma gota por Kg de peso.
Classe Terapêutica: Antiinflamatório
Categorias: Dor e Contusão, Antiinflamatórios