

Napronax

Indicações: - Mialgias, relacionada a doenças reumatológicas como artrite reumatóide, artrite reumatóide juvenil, osteoartrose, espondilite anquilosante, gota, dor ciática, bursite, tendinite, torcicolo, lombalgia, quadros dolorosos da coluna vertebral.

- Enxaqueca e Cefaléia.

- Traumatismos, inflamações varicosas, hematoma.

- Como auxiliar nas inflamações das vias áreas superiores.

Contra-Indicações: É contra-indicado em pacientes que apresentam hipersensibilidade ao naproxeno ou naproxeno sódico, úlcera péptica gástrica ou duodenal ativa e sangramento gastrointestinal ativo.

Interação: Alimentos, antiácidos ou colestiramina: absorção prejudicada do naproxeno.

Deve-se ter cautela com o uso de anticoagulantes do tipo cumarínicos, sulfonamidas ou sulfoniluréias, outros antiinflamatórios não esteroidais, ácido acetilsalicílico, hidantoínas.

Warfarina: aumento da concentração da warfarina..

Lítio: eliminação do lítio prejudicada.

Propranolol e outros beta-bloqueadores: efeito anti-hipertensivo reduzido.

Probenecida: eleva os níveis plasmáticos do naproxeno.

Metotrexato: a toxicidade do metotrexato pode ser aumentada.

Posologia: Adultos:

Comprimidos de 250mg: tomar 1 comprimido, 1 a 2 vezes ao dia ou a critério médico.

Comprimidos de 500mg: tomar 1 comprimido, 1 vez ao dia ou a critério médico.

O comprimido deverá ser ingerido com um pouco de líquido, sem mastigar.

Não é recomendado o uso por mais de 10 dias consecutivos, a não ser sob orientação médica.

Classe Terapêutica: Antiinflamatório

Categorias: Dor e Contusão, Antiinflamatórios