

Piroxicam

Composição de Piroxicam

cada cápsula contém: **piroxicam** 10 mg ou 20 mg. Excipientes: manitol, amido, malto-dextrina, talco e sílica precipitada amorfa. Cada 1 ml (20 gotas) contém: **piroxicam** 10 mg. Excipientes: parabenos, ciclamato de sódio, **sacarina** sódica, carboximetilcelulose, álcool etílico, glicerina bidestilada, corante, essência, água purificada.

Posologia e Administração de Piroxicam

a critério médico, recomenda-se: osteoartrites, **artrite reumatóide** e espondilite anquilosante: 20 mg diários em dose única inicialmente; de acordo com a resposta do paciente a dose pode ser ajustada para 10 mg/dia em dose única ou 30 mg/dia em dose única ou fracionada. Distúrbios musculoesqueléticos, traumas e pós-operatório: 40 mg/dia em dose única ou fracionada nos dois primeiros dias e a seguir 20 mg/dia em dose única durante 5 a 12 dias. **Gota** aguda: 40 mg/dia em dose única no primeiro dia e 40 mg/dia em doses fracionadas por mais 6 dias consecutivos. **Dismenorréia** primária: 40 mg/dia em dose única nos dois primeiros dias do período menstrual, seguido por 20 mg/dia em dose única até o 5º dia.

Precauções de Piroxicam

apesar de não existirem relatos de efeitos **teratogênicos** em testes em animais, **Piroxicam** atravessa a barreira placentária e aparece no leite materno, devendo a sua administração em gestantes ou mulheres em fase de **lactação** ser feita somente após avaliação médica dos fatores riscos-benefícios. Deve ser administrado com cautela em pacientes portadores de **insuficiência cardíaca congestiva, cirrose hepática, síndrome nefrótica** e doenças renais. **Piroxicam** diminui a agregação plaquetária e conseqüentemente aumenta o tempo de sangramento. As indicações e a posologia para o uso em crianças menores de 12 anos ainda não foram estabelecidas. Provoca aumentos reversíveis do nitrogênio uréico e **creatinina**. Pacientes idosos (acima de 65 anos) só devem fazer uso do medicamento sob prescrição e acompanhamento médico. - Interações medicamentosas: o uso concomitante com ácido acetilsalicílico ocasiona uma redução dos níveis plasmáticos de **Piroxicam** para cerca de 80% dos valores normais. O uso simultâneo de **Piroxicam** com **anticoagulantes** orais deve ser controlado cuidadosamente. **Piroxicam** aumenta o tempo dos níveis plasmáticos do lítio, portanto recomenda-se uma monitoração destes níveis até o ajuste da posologia adequada.

Reações Adversas de Piroxicam

as mais comuns envolvem distúrbios gastrintestinais, tais como: **náuseas, vômitos, flatulência, constipação intestinal, diarreia**, desconforto epigástrico e abdominal. Em alguns indivíduos podem ocorrer **ulceração péptica**, perfuração e sangramento gastrointestinal. Raramente podem ocorrer **tontura, cefaléia**, sonolência, nervosismo, **alucinações**, confusão mental, **vertigem, edema** dos olhos, **visão** turva e irritações oculares.

Contra-Indicações de Piroxicam

pacientes portadores de **úlcera péptica**, hipersensibilidade a qualquer dos componentes da fórmula, ou indivíduos que apresentaram **sintomas** semelhantes de broncospasma, **pólipo** nasal e **angioedema** após administração de ácido acetilsalicílico ou outros antiinflamatórios não esteróides.

Indicações de Piroxicam

diversas condições patológicas que requerem atividade antiinflamatória e/ou analgésica, tais como: **artrite reumatóide**, espondilite anquilosante, artroses, distúrbios musculoesqueléticos, pós-operatório, **gota** aguda, estados pós-traumáticos e nos casos de **dismenorréia** primária.

Apresentação de Piroxicam

caixa com 15 cápsulas de 10 mg e caixa com 15 cápsulas de 20 mg. Gotas: frasco plástico gotejador com 15 ml de suspensão oral.

PIROXICAM - Laboratório

NEO QUIMICA
Rua VPR 1, Quadra 2-A, Mód. 4

Anápolis/GO - CEP: 75133600
Tel: (62)316-1055
Fax: (62)316-1022