

Snif 3%®

cloreto de sódio

Solução hipertônica nasal

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES

Spray nasal estéril - cartucho com frasco contendo 45 mL.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

Uso intranasal.

Composição:

Cada mL de Snif 3%® (cloreto de sódio) contém:
 cloreto de sódio.....30 mg
 Veículos q.s.p.....1 mL
 Veículos: fosfato monossódico anidro, fosfato dissódico anidro, água destilada

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Snif 3%® (cloreto de sódio) é uma solução hipertônica de uso tópico (local), que aumenta o movimento mucociliar e fluidifica o muco das fossas nasais, facilitando sua eliminação.

POR QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?

Snif 3%® (cloreto de sódio) ajuda a aliviar os sintomas de: sinusite, rinites de qualquer etiologia e congestão nasal. Indicado também para higienização das fossas nasais, por remoção e fluidificação do muco. Também como tratamento prévio ao uso de esteróides por via nasal.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

CONTRA-INDICAÇÕES

SNIF 3%® (CLORETO DE SÓDIO) É CONTRA-INDICADO PARA PACIENTES COM HISTÓRIA DE HIPERSENSIBILIDADE (ALERGIA) A QUALQUER UM DOS COMPONENTES DO PRODUTO.

USO DURANTE A GRAVIDEZ E LACTAÇÃO:

NÃO EXISTEM RESTRIÇÕES PARA O USO DURANTE A GRAVIDEZ E LACTAÇÃO.

USO PEDIÁTRICO E GERIÁTRICO:

NÃO EXISTEM RESTRIÇÕES PARA ESSE GRUPO ETÁRIO.

ESTE PRODUTO É RECOMENDADO PARA USO EXCLUSIVAMENTE LOCAL E NÃO DEVE SER INGERIDO POR VIA ORAL. PORTANTO, SE OCORRER A INGESTÃO DE GRANDES QUANTIDADES DO PRODUTO, PROCURE O MÉDICO. O TRATAMENTO É FEITO DE ACÓRDO COM OS SINTOMAS.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

NÃO HÁ REGISTRO DE INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS COM SNIF 3%® (CLORETO DE SÓDIO).

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se ocorrer gravidez ou iniciar amamentação durante o uso deste medicamento.

Não há contra-indicações relativas a faixas etárias.

Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento

de reações indesejáveis.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

SPRAY NASAL ESTÉRIL:

SNIF 3%® (cloreto de sódio) spray nasal tem acoplado hermeticamente ao frasco um aplicador que facilita seu uso, produzindo um spray que chega efetivamente em profundidade nas fossas nasais. Ao mesmo tempo, seu desenho de avançada tecnologia impede que ingressem no frasco bactérias que interfiram na esterilidade do produto.

Para o perfeito acionamento da válvula recomenda-se não deitar o frasco no momento da aplicação.



1. Remover a tampa protetora da válvula;



2. Segurar o frasco com o dedo médio e o indicador sobre a válvula e o polegar na base do frasco;



3. Antes de usar SNIF 3%® (cloreto de sódio) pela primeira vez ou após 24 horas, a válvula deve ser carregada. Para isso, pressione a válvula com os dedos indicador e médio, algumas vezes;



4. Pressionar uma das narinas com o dedo indicador e na outra introduza a ponta do aplicador na posição vertical (com o bico para cima), pressionando o aplicador o número de vezes indicado pelo seu médico, conforme indicado na figura ao lado. Não inclinar a cabeça para trás, no momento da aplicação.



5. Retirar o aplicador da narina e respirar pela boca;



6. Repetir na outra narina o mesmo procedimento;



7. Lavar o aplicador e colocar a tampa protetora.

“NUNCA EMPRESTE SEU SPRAY NASAL PARA OUTRA PESSOA.”

“Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica ou de seu cirurgião-dentista”

“Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento”

POSOLOGIA

SPRAY NASAL ESTÉRIL: recomenda-se de 1 a 2 aplicações em cada fossa nasal, 3 ou mais vezes ao dia, segundo critério médico.

Apresentação	Dose
Spray nasal	1 a 2 aplicações

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

NÃO SÃO DESCRITAS CONTRA-INDICAÇÕES.

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE QUANTIDADE DESSE PRODUTO DE UMA SÓ VEZ?

Este medicamento é exclusivamente de uso tópico nasal e não deve ser ingerido em nenhuma condição. Porém, se ocorrer a ingestão deste produto, especialmente em grandes quantidades, o tratamento será realizado conforme os sintomas.

COMO DEVO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30° C).

PRAZO DE VALIDADE

Desde que observados os devidos cuidados de conservação, o prazo de validade de Snif 3%® (cloreto de sódio) é de 24 meses, contados a partir da data de fabricação impressa em sua embalagem externa.

“Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças”

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

1. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

Modo de ação

Snif 3%® (cloreto de sódio) solução hipertônica, atua por ação tóxica, favorecendo a eliminação dos mucoos, alérgenos e outra s partículas presentes nas fossas nasais, aumentando o movimento muco ciliar.

INDICAÇÃO

Snif 3%® (cloreto de sódio) ajuda a aliviar os sintomas de: sinusite, rinites de qualquer etiologia e congestão nasal. Indicado também para higienização das fossas nasais, por remoção e fluidificação do muco. Também como tratamento prévio ao uso de esteróides por via nasal.

CONTRA-INDICAÇÕES

SNIF 3%® (CLORETO DE SÓDIO) É CONTRA-INDICADO PARA PACIENTES COM HISTÓRIA DE HIPERSENSIBILIDADE (ALERGIA) A QUALQUER UM DOS COMPONENTES DO PRODUTO.

USO DURANTE A GRAVIDEZ E LACTAÇÃO:

NÃO EXISTEM RESTRIÇÕES PARA O USO DURANTE A GRAVIDEZ E LACTAÇÃO.

USO PEDIÁTRICO E GERIÁTRICO:

NÃO EXISTEM RESTRIÇÕES PARA ESSE GRUPO ETÁRIO.

ESTE PRODUTO É RECOMENDADO PARA USO EXCLUSIVAMENTE LOCAL E NÃO DEVE SER INGERIDO POR VIA ORAL. PORTANTO, SE OCORRER A INGESTÃO DE GRANDES QUANTIDADES DO PRODUTO, PROCURE O MÉDICO. O TRATAMENTO É FEITO DE ACORDO COM OS SINTOMAS.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

NÃO HÁ REGISTRO DE INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS COM SNIF 3%® (CLORETO DE SÓDIO).

MODO DE USAR

SPRAY NASAL ESTÉRIL:

SNIF 3%® (cloreto de sódio) spray nasal tem acoplado hermeticamente ao frasco um aplicador que facilita seu uso, produzindo um spray que chega efetivamente em

profundidade nas fossas nasais. Ao mesmo tempo, seu desenho de avançada tecnologia impede que ingressem no frasco bactérias que interfiram na esterilidade do produto.

1. Remover a tampa protetora da válvula;
2. Segurar o frasco com o dedo médio e o indicador sobre a válvula e o polegar na base do frasco;
3. Antes de usar SNIF 3%® (cloreto de sódio) pela primeira vez ou após 24 horas, a válvula deve ser carregada. Para isso, pressione a válvula com os dedos indicador e médio, algumas vezes;
4. Pressionar uma das narinas com o dedo indicador e na outra introduza a ponta do aplicador na **posição vertical** (com o bico para cima), pressionando o aplicador o número de vezes indicado pelo médico. Não inclinar a cabeça para trás, no momento da aplicação.
5. Retirar o aplicador da narina e respirar pela boca;
6. Repetir na outra narina o mesmo procedimento;
7. Lavar o aplicador e colocar a tampa protetora.

POSOLOGIA

SPRAY NASAL ESTÉRIL: recomenda-se de 1 a 2 aplicações em cada fossa nasal, 3 ou mais vezes ao dia, segundo critério médico.

Apresentação	Dose
Spray nasal	1 a 2 aplicações

SUPERDOSAGEM

Este medicamento é exclusivamente de uso tópico nasal e não deve ser ingerido em nenhuma condição. Porém, se ocorrer a ingestão deste produto, especialmente em grandes quantidades, o tratamento será realizado conforme os sintomas.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

Conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30° C).

PRAZO DE VALIDADE

Desde que observados os devidos cuidados de conservação, o prazo de validade de Snif 3%® (cloreto de sódio) é de 24 meses, contados a partir da data de fabricação impressa em sua embalagem externa.

VENDA SEM RECEITUÁRIO MÉDICO.

N.º de lote, data de fabricação e prazo de validade: VIDE CARTUCHO.

Para sua segurança mantenha a embalagem até o uso total do medicamento.

MS - 1.0043.0915

Farm. Resp.: Dra. Sônia Albano Badaró - CRF-SP 19.258

Produzido por:

LABORATÓRIO PABLO CASSARÁ

Carhué 1096, Buenos Aires – Argentina.



Importado e Distribuído por:
EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA.
Av. Ver. José Diniz, 3465, São Paulo – SP
CNPJ: 61.190.096/0001-92
Indústria Brasileira

