

Tandriflan

Laboratório

União Química

Apresentação de **Tandriflan**

compr.: caixa c/ 30 compr.

Tandriflan - Indicações

Reumatismo nas suas formas inflamatório-degenerativas agudas e crônicas; crises agudas de gota, estados inflamatórios agudos, pós-traumáticos e pós-cirúrgicos. Exacerbações agudas de artrite reumatóide, osteoartrose e estados agudos de reumatismo nos tecidos extra-articulares. Coadjuvante em processos inflamatórios graves decorrentes de quadros infecciosos.

Contra-indicações de Tandriflan

Úlcera péptica ativa; hipersensibilidade a qualquer dos componentes ativos da fórmula; discrasias sangüíneas; diáteses hemorrágicas (trombocitopenia, distúrbios da coagulação), porfíria; insuficiência cardíaca, hepática ou renal grave; hipertensão grave. É contra-indicado a pacientes asmáticos nos quais são precipitados acessos de asma, urticária ou rinite aguda pelo ácido acetilsalicílico e demais inibidores da via da ciclooxygenase da síntese de prostaglandinas. Embora não se tenha evidenciado nenhum efeito teratogênico, o uso de **Tandriflan** durante a gravidez e lactação é desaconselhado.

Tandriflan - Posologia

Como regra geral, a dose mínima diária recomendada é de um comprimido a cada 12 horas. Aconselha-se individualizar a posologia de **Tandriflan**, adaptando o quadro clínico, bem como a idade do paciente e às suas condições gerais. Deverão ser administradas as mais baixas doses eficazes e, sempre que possível, a duração do tratamento não deverá ultrapassar 10 dias. Tratamentos mais prolongados requerem observações especiais (vide Precauções). Os comprimidos de **Tandriflan** deverão ser ingeridos inteiros (sem mastigar), às refeições, com auxílio de líquido.