

## Laboratório

Neo Química

## Referência

Anlodipino

## Apresentação de **Tensaliv**

compr. 5mg: cx. c/ 20.

## Contra-indicações de **Tensaliv**

É contra-indicado em pacientes com história de hipersensibilidade às diidropiridinas (bloqueadores de cálcio) e em casos de hipotensão grave.

## Reações adversas / Efeitos colaterais de **Tensaliv**

Os efeitos colaterais observados com mais frequência, em estudos clínicos placebo-controlados, envolvendo pacientes com angina ou hipertensão, foram os seguintes: dor de cabeça, edema, fadiga, sonolência, náusea, dor abdominal, rubor, palpitações e tontura. Os efeitos menos frequentemente observados incluem: prurido, rash, dispnéia, astenia, câibras musculares e sispesia. Como os demais bloqueadores do canal de cálcio, os seguintes eventos adversos foram relatados raramente, e não podem ser distinguidos da história natural da doença de base: edema pulmonar, infarto do miocárdio, taquicardia, bradicardia, hiperplasia gengival, hipotensão excessiva e dor torácica. Em exames laboratoriais não foram observados quaisquer tipos de anormalidades clinicamente significativas nos testes relacionados à amlodipina.

## **Tensaliv** - Posologia

A dose inicial usual de **Tensaliv**, no tratamento da angina e hipertensão é de 5mg (1 comprimido), uma vez ao dia, podendo ser aumentada para uma dose máxima de 10mg (2 comprimidos), dependendo da resposta individual do paciente. Não é necessário ajustar a dose da amlodipina na administração concomitante com diuréticos, betabloqueadores e inibidores da enzima conversora da angiotensina.